

Haut - / Weichteilinfektionen

Diagnostik:

Bei Fieber: 2 x Blutkulturpaare abnehmen

Bei Hautläsion/Wunde: Abstriche (tief) und/ oder Debridement-Material

Mikrobiologische Vorbefunde beachten (z.B. MRSA, MRGN)

	<u>Standard</u>	<u>Alternative</u> (Penicillin-Allergie)
Bisswunde (Hund, Katze, Mensch)	Amoxicillin/Clavulansre. 3x 1g p.o.	Moxifloxacin 1x 400 mg p.o.
Erysipel	Penicillin G 5 Mio IE 4x/d i.v. oder peroral: Amoxicillin 3x1 g p.o.	Clindamycin 3x 600 mg p.o.
Zellulitis/Phlegmone	Amoxicillin/Clavulansre. 3x 1g p.o. Ampicillin /Sulbactam 3x 3g i.v.	Clindamycin 3x 600 mg p.o.
Phlegmone bei Immunsuppression	Piperacillin + Tazobactam 3x 4,5g i.v.	Imipenem/Cilastatin 4x1 Amp. i.v.
Nekrotisierende Faszitis (ambulant erworben)	Ceftriaxon 2x 2 g i.v. plus Clindamycin 4x 900 mg i.v.	Meropenem 3x 1 g i.v. plus Clindamycin 4 x 900 mg i.v.
Nekrotisierende Faszitis (postoperativ)	je nach OP/Vorbefunden (infekt. Konsil empfohlen) Meropenem 3x 1 g i.v. plus Vancomycin gemäß interner Leitlinie	