

8.1.3 Sexuelle Exposition

Sexuelle Exposition		
Ungeschützter Geschlechtsverkehr mit bekannt HIV-infizierter Person		
<u>Expositionsergebnis</u>	<u>Kommentar</u>	<u>PEP-Indikation</u>
Oralverkehr, unabhängig von der Art des Oralverkehrs (aktiv, passiv. Sperma aufnehmend)		Keine PEP-Indikation
Ungeschützter insertiver oder rezeptiver vaginaler oder analer Geschlechtsverkehr (z. B. infolge eines geplatzten Kondoms).	Transmissionsrisiko in erster Linie vom Behandlungsstatus bzw. der Viruslast bei der behandelten Person abhängig.	<p>Keine PEP-Indikation</p> <ul style="list-style-type: none"> - wenn Indexperson wirksam behandelt (VL < 50 Kopien/ml) <p>PEP anbieten</p> <ul style="list-style-type: none"> - wenn VL der Indexperson 50-1000 Kopien/ml <p>PEP empfehlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - wenn Indexperson unbehandelt bzw. VL >1000Kopien/ml - wenn Behandlungsstatus nicht eruierbar ist
Ungeschützter Geschlechtsverkehr bei unbekanntem HIV-Status der Partnerin/des Partners		
Ungeschützter heterosexueller Vaginal- oder Analverkehr, auch Sexarbeiter*Innen		keine PEP
Ungeschützter Analverkehr zwischen Männern		<p>PEP anbieten</p> <ul style="list-style-type: none"> - wenn ungeschützter Anaverkehr wiederholt erfolgt (Anamnese!), sollte zusätzlich eine Präventionsberatung empfohlen werden.
Ungeschützter heterosexueller Vaginal- oder Analverkehr <ul style="list-style-type: none"> - mit aktiv intravenös Drogenkonsumierendem Partner/in - mit bisexuellem Partner - mit Partner/in aus HIV-Hochprävalenzregionen (v. A. Subsahara-Afrika, bisexuell) 		PEP anbieten
Bei Vergewaltigung		
Oralverkehr (aktiv, passiv, mit Sperma), unabhängig vom HIV-Risiko des Täters		Keine PEP

8.1.3 Sexuelle Exposition

Ungeschützter Anal- oder Vaginalverkehr	PEP anbieten
Biss- und Schnittverletzungen	
Tiefe blutige Bissverletzungen durch HIV-positive Person ohne adäquate Therapie mit blutenden Wunden im Mund (z.B. Zungenbiss bei epilept. Anfall)	Keine PEP
Serielle blutende Verletzungen, durch das selbe Instrument (z.B. Messer) bei unbekanntem/bekanntem HIV Status	PEP anbieten

Quellen: Deutsch-Österreichische Leitlinie zur Post-Expositionsprophylaxe bei HIV 2022; https://register.awmf.org/assets/guidelines/055-004I_S2k_Medikamentoese-Postexpositionsprophylaxe-PEP-nach-HIV-Exposition_2022-06.pdf).